

Профилактика



Прививка БЦЖ

Прививка делается детям на 3-7-е сутки после рождения, чтобы сформировать иммунитет к туберкулезу.



Правила гигиены:

- Чаще мойте руки, не трогайте немытыми руками лицо и глаза.
- Не выходите на работу и не отправляйтесь на отдых, если кашляете. Обратитесь к врачу и пройдите медоследование.
- Помните, что влажные салфетки, которыми вы протираете руки, не воздействуют на микобактерии туберкулеза — салфетки содержат спирт, к которому устойчивы микобактерии.
- Не позволяйте ребенку брать в рот немытые игрушки, не берите мягкие игрушки на прогулку с малышом.



Избегайте контактов с кашляющими людьми, особенно — с длительно кашляющими.



Чаще бывайте на свежем воздухе, гуляйте в солнечную погоду, занимайтесь спортом.



Питайтесьrationально:

- белковая пища (мясо, рыба, птица и т. д.);
- продукты, богатые кальцием (бобовые, изюм, молоко, творог и др.);
- овощи и фрукты.



Не переутомляйтесь, соблюдайте режим труда и отдыха.



Откажитесь от вредных привычек (курение, алкоголь, наркотики).



Избегайте переохлаждения: следите за прогнозом погоды и одевайтесь соответственно




ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР
МЕДИЦИНСКОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ

Хочешь
дышать легко?
#неболей74

Что нужно знать
о туберкулезе?



@
NEBOLEJ74



Факторы риска



Симптомы

Туберкулез часто протекает бессимптомно. Его можно выявить только при специальном обследовании. Для этого существуют диспансеризация и профилактические медицинские осмотры.

Однако у некоторых пациентов могут быть клинические проявления. Обратить внимание на состояние здоровья и своевременно обратиться к врачу необходимо, если у вас или у вашего ребенка появился один или несколько из этих симптомов:

- кашель более двух-трех недель;
- боль в грудной клетке, связанная с дыханием;
- кровохарканье: «ржавая мокрота», плевки чистой крови, прожилки крови в мокроте;
- длительное повышение температуры;
- потеря веса, не связанная со специальной диетой для похудания;
- слабость, усталость и быстрая утомляемость;
- повышенная потливость, особенно по ночам.

Диагностика



Проба Манту

Это не прививка, а диагностический тест на присутствие в организме микобактерий туберкулеза. Она проводится независимо от предыдущего результата пробы 1 раз в год:

- детям с 12 месяцев в детских садах, школах, поликлиниках по месту жительства;
- детям и подросткам до 18-ти лет в образовательных организациях или в детских поликлиниках по месту жительства;
- детям, непривитым БЦЖ в период новорожденности, проба Манту ставится с 6-ти месяцев 2 раза в год



Диаскинвест

Современный диагностический внутрикожный тест с аллергеном туберкулезным рекомбинантным, по результатам которого можно выявить туберкулез. Этот тест безопасен даже для беременных женщин. Диаскинвест не является прививкой!



Флюорография

Способ диагностики туберкулеза легких у лиц, старше 15 лет 1 раз в год (кроме отдельных групп населения).



Квантифероновый тест

Современный лабораторный тест для выявления туберкулезной инфекции, альтернатива классическому кожному тесту с туберкулином.



Микроскопическое исследование мокроты

Анализ с достаточно низкой чувствительностью (требуется большое количество бактерий, чтобы результат был точен).


Стадии развития туберкулеза



Первичное туберкулезное инфицирование



Латентная (скрытая) инфекция



Mycobacterium tuberculosis
(возбудитель туберкулеза)

Рецидивирующий туберкулез

Пути заражения



При попадании возбудителя в организм человека через кожу и слизистые при их повреждении



Через продукты питания, например, мясо и молоко больных животных



При вдыхании высохших частиц и пыли, содержащих опасный возбудитель



От больных туберкулезом при кашле, чихании